

{ ایمنی و سلامت شغلی }

www.westnikanhospital.com

راهنمای نحوه برخورد با موارد NEEDLE STICK

تهیه شده در واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان نیکان
تاپستان ۱۴۰۰

اتوبان همت به سمت غرب، بعد از بوستان جوانمردان
بیمارستان نیکان غرب
تلفن : ۰۲۱-۲۹۱۲۰۰۰۰

کد مدرک WNH-DOC-OCH-00274-02 تاریخ ابلاغ 01/12/08

کنترل شد
۱۴۰۵/۰۲/۲۰
تاریخ بازنگری بعدی
۱۴۰۶/۰۵/۳۱
بیمارستان نیکان غرب

- بیماری را که سر سوزن مخصوص به او به شما اصابت کرده جهت بررسی عفونت شناسایی کنید.
 - تمام مراحل را که برای آزمایش خون واکسیناسیون و اقدامات پزشکی جهت پیشگیری از عفونت نیاز است انجام دهید.
 - حادثه ایجاد شده را در فرم ثبت حادثه ثبت نمایید.
- (فرم مذکور در SHARE عمومی - واحد های پیشبانی - بهداشت حرفه ای میباشد).



رعایت ایمنی و

بهداشت کار

ضامن سلامتی شماست.



واکسیناسیون:

کلیه پرسنل بهداشتی درمانی که در مواجهه با خون هستند باید علیه ویروس هپاتیت B ایمن (واکسینه) گردند. توصیه می شود یک تا دو ماه پس از تزریق دوز واکسن هپاتیت B (پس از تزریق دوز سوم) آزمون HBsAB در تمام پرسنل صورت گیرد تا از وضعیت ایمنی آنها علیه ویروس هپاتیت B اطمینان حاصل گردد.



اگر دچار صدمه NEEDLE STICK شدید:

- زخم را با صابون و آب ولرم بشویید.
- زخم خود را فشار ندهید و اجازه دهید خون آزادانه بیرن بیاید.
- سریعاً به سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت گزارش دهید و تا پایان عملیات کاری یا شیفت کاری صبر نکنید.



جلوگیری از وقوع needle stick و بروز عفونت:

■ از شکستن و یا خم کردن سر سوزن قبل از دفع خودداری نمایید.

■ جهت حمل وسایل تیز و برنده از ریسپور استفاده کنید و از حمل وسایل مزبور در دست و جیب یونیفورم خودداری نمایید.

■ از دست به دست نمودن وسایل تیز و برنده (بیستوری، سرسوزن و غیره) اجتناب کنید.

■ در صورتیکه بریدگی و یا زخمی در دستها وجود دارد الزامی است از دستکش استفاده

شود و موضع با پانسمان ضدآب پوشانده شود.



■ در صورتی که کارکنان دچار آگرمای و یا زخم های باز می باشند معاینه پزشک جهت مجوز شروع فعالیت در بخش ضروری است.

■ همیشه ظروف مخصوص دفع اشیای تیز و برنده را نزدیک به محل کار با این اشیاء قرار دهید.

■ وقفه های کاری را حداقل امکان محدود کنید.



■ مراحل کار را برای بیمار توضیح دهید تا با شما همکاری کند و در طول انجام کار کمتر حرکت کند.

■ هنگام انجام کار روی افرادی که ممکن است با شما همکاری نکنند (مثل کودکان) از دیگران کمک بگیرید.



■ رعایت احتیاطات عمومی در حین انجام هرگونه اقدام در مانی که احتمال آلودگی

با خون و سایر ترشحات بدن وجود دارد که از جمله استفاده از وسایل

حفاظت فردی شامل دستکش، ماسک، گان، عینک و غیره ضروریست.

جلوگیری از وقوع NEEDLE STICK و بروز عفونت:

■ هیچگاه در پوش سوزنها را نگذارید.



■ در موارد ضروری جهت گذاشتن درپوش سرسوزن از وسایل مکانیکی جهت ثابت نگه داشتن درپوش استفاده نمایید و یا از یک درست به روش scoop جهت گذاشتن درپوش سرسوزن استفاده کنید.



■ سرسوزنهای استفاده شده را در safety box بیندازید.

■ هیچگاه ظروف safety box را بیش از حد پر نکنید.



نیدل استیک شدن به مفهوم آسیب نفوذی جلدی ناشی از وسایل پزشکی نوک تیز در صورت آلوده بودن به خون یا ترشحات بدن بیمار، بزرگترین خطی است که می تواند کارکنان خدمات بهداشتی درمانی را تهدید کند.

صدمه ناشی از تماس سرزون آلوده که یک فرد با آن تماس پیدا می کند و وی را در مواجهه با پاتوژنهای خونی قرار می دهد می تواند باعث عفونت های جدی یا کشنده شود.

جدی ترین عفونت های عبارتند از:

HIV

Cهپاتیت

Bهپاتیت

برخی عوامل که منجر به بروز نیدل استیک می شوند:

■ تجهیزات غیر ایمن

■ قرار دادن نامناسب ظروف دفع سر سوزن و یا پر شدن بیش از حد آنها.

■ شلوغ و متراکم بودن محیط کار با فشار کاری و کار با عجله

■ وقفه های بی دلیل و مکرر در بین کار.

■ طی گذاشتن مجدد درپوش یا محافظ سوزن.