

تعاریف اپیدمیولوژیک بیماری های فوری

فلج شل حاد	وقوع هر نوع فلج شل ناگهانی در اندامها (بدون سابقه ضربه) در افراد زیر ۱۵ سال
سیاه سرفه	هر موردی که طبق نظر پزشک از لحاظ بالینی به عفونت سیاه سرفه مشکوک باشد و یا هر فردی که حداقل دو هفته سرفه همراه با حد اقل یکی از علائم: حملات سرفه قطاری هنگام دم، استفراغ بعد از حمله سرفه داشته باشد. Whoop
سرخک	هر شخصی که به نظر پزشک از لحاظ بالینی مشکوک به سرخک بوده یا هر شخصی با تب و راش ماکولوپاپولر (غیروزیکولار) سرفه و کوریزا (آبریزش بینی) یا کنژنکتیویت
دیفتری	بیمار دارای غشای چسبنده در لوزه، حلق یا بینی و متعاقب آن هر یک از موارد لارنژیت، فارتژیت و یا تونسیلیت
سندرم سرخجه مادرزادی	هر کودک کمتر از یکسال که کارمندان بهداشتی در او مشکوک به CRS شوند. هر کودک کمتر از یک سال دارای تاریخچه مادرزادی مشکوک یا تایید شده ابتلا به سرخجه در دوران حاملگی هر نوزادی با بیماری قلبی و یا مشکوک به کری و یا با یک یا چند علامت از علائم چشمی مردمک سفید (کاتاراکت)، کاهش دید، حرکات پاندولی چشم (نیستاگموس)، لوچی، کره چشم کوچک (میکروفتالموس) (قرنیه بزرگتر (گلوکوک مادرزادی)
کزاز نوزادان	مرگ نوزاد در سن ۳ تا ۲۸ روز که علت مرگ مشخص نباشد. هر نوزادی که طبق گزارش به علت کزاز نوزادی فوت نموده و مورد بررسی قرار نگرفته باشد
عوارض ایمنسازی	عارضه ایست که پس از ایمن سازی به (AEFI) هر پیامد نا مطلوب متعاقب ایمنسازی وجود آمده و عقیده بر این است که علت آن واکنش های سیستم ایمنی است (مورد مرگ بستری در بیمارستان، آبسه و هر عارضه ای که باعث تشویش اذهان عمومی شود). سایر عوارض ایمنسازی غیر فوری
وبا (التور)	هر فرد بالای ۲ سال که در اثر اسهال حاد آبکی دچار کم آبی شدید شود یا به علت اسهال آبکی بمیرد
بو تولیسم	بیمار با علائم مسمومیت غذایی بدون تب، فلج شل پایین رونده قرینه، درگیری اعصاب حرکتی کرانیال (بدون درگیری بویایی و بینایی و اعصاب حسی)، دیلاتاسیون پاپی و دو بینی
مننژیت	شروع ناگهانی تب همراه با هر یک از علائم سفتی گردن، کاهش سطح هوشیاری، علائم مننژیتال (سردرد، استفراغ و هر نوع عاظه نورولوژیک ناگهانی) فونتانل برجسته (در اطفال) در هر سنی به عنوان مظنون به مننژیت تلقی می گردد
مالاریا	عفونت حاد همراه با تب های متناوب با حملات دوره ای، لرز، تعریق، سرفه، اسهال، سردرد و
بیماریهای بثور خونی دهنده مثل CCHF	داشتن علائم خونریزی، تب و درد عضلانی به همراه سابقه اپیدمیولوژیک شامل) سابقه گزش با کنه و یا له کردن کنه با دست، تماس مستقیم با خون تازه یا سایر بافت های دام، و اقامت یا CCHF تماس مستقیم با خون و ترشحات یا مواد دفعی بیمار مشکوک به مسافرت در محیط روستایی که احتمال تماس با دمها یا کنه وجود داشته باشد
حیوان گزیدگی	هرگونه مواجهه انسان با حیوان حساس به هاری یا حیوانی که در منطقه آلوده به هاری زندگی میکند، اعم از تماس با بزاق، گزش و یا ایجاد خراش
سیار بیماریهای فوری	آنفلونزا - تیفوس - تب زرد - طاعون - تب راجعه
مثبت - HIV سیر بیماریهای مشمول گزارش غیر فوری سل - تیفوئید - هپاتیت های ویرال - ایدز و موارد بیماریهای آمیزشی - سالک و کالآزار - شیگولز - کزاز بالغین - بروسلوز - سیاه زخم جلدی - کیست هیداتیک توکسوپلاسموز - پدیکولوز - گال و بیماری های قارچی - جذام	