



در سی تی اسکن هایی که با تزریق همراه می باشد. قبل از انجام آزمون نیاز به آمادگی خاص می باشد. این آزمون ممکن است با تزریق ماده حاجب و یا همزمان با تزریق ماده حاجب و هم داروی خوراکی انجام گردد.

آمادگی های قبل از آزمون:

- ۱- بیمار باید ۴ تا ۶ ساعت ناشتا باشد.
- ۲- مصرف متفورمین ۴۸ ساعت قبل و ۴۸ ساعت بعد از تزریق قطع گردد.
- ۳- همراه داشتن آزمایش اوره و کراتینین در روز آزمون ضروری است.
- ۴- در روز آزمون باید فرم تزریق و حساسیت دارویی توسط بیمار تکمیل شود.
- ۵- چنانچه بیمار هرگونه حساسیت دارویی و غذایی خاص دارد کارشناس مربوطه باید از آن مطلع گردد تا در صورت نیاز و با هماهنگی و دستور رادیولوژیست پروتکل حساسیت بر روی بیمار اجرا گردد.

اقدامات پس از انجام آزمون:

- ۱- پس از انجام آزمون اقدام خاصی لازم نیست و بیمار توصیه به آب درمانی میشود.
- ۲- از بیمار درخواست میشود تا یک ساعت پس از انجام پروسیجر در بخش حضور داشته باشد تا در صورت بروز هرگونه آلرژی بر روی بیمار اقدامات درمانی انجام گردد.
- ۳- از بیمار درخواست میگردد چنانچه تا ۴۸ ساعت پس از آزمون هر گونه حساسیت شامل کهیر و راش پوستی مشاهده شد به مرکز درمانی مراجعه نماید.