



داروی خوراکی سی تی اسکن:

در سی تی اسکن های درخواست شده با کنتراست شکم و لگن به استثنای بیماران اورولوژی و یا بیمارانی که منع مصرف دارو خوراکی دارند استفاده از داروی خوراکی برای بررسی سیستم گوارشی شامل معده، روده باریک و روده بزرگ الزامی می باشد. در صورت عدم مصرف داروی خوراکی سیستم گوارشی قابل قضاوت نبوده و برای پزشکان رادیولوژیست امکان گزارش وجود ندارد.

طرز تهیه دارو:

در یک آب معدنی یک و نیم لیتری حدود ۳۰ سی سی داروی خوراکی که شامل مگلو مین می باشد مخلوط شود. (در بیماران با وزن بالای ۹۰ کیلوگرم مقدار مصرف داروی خوراکی باید بیشتر باشد)

مصرف دارو:

باید بیمار برای اینکه تمام سیستم گوارشی شامل روده باریک و روده بزرگ از دارو پر باشد هر ۲۰ دقیقه یک لیوان یکبار مصرف از دارو را میل کرده و آخرین لیوان را هم بعد از انتقال به بخش تصویربرداری روی تخت سی تی اسکن برای بررسی معده میل نماید. (در طول مصرف دارو مشکلی از نظر تخلیه مثانه و روده وجود ندارد).

توجه: فقط در تعدادی از بیماران که جراحی شامل اسلیو یا بایپس جدید انجام داده اند داروی خوراکی به میزان کمتر و در بخش تصویربرداری مصرف می شود.