



تعریف و نحوه انجام بیوپسی	
بیوپسی پستان نمونه برداری از بافت و ضایعه پستانی است که تحت هدایت سونوگرافی و توسط سوزنی باریک و ظریف بعد از بیحسی موضعی انجام می شود. با یک سرنگ محل بیوپسی بیحس می شود و بعد از ایجاد بیحسی، تحت هدایت سونوگرافی توسط یک سوزن باریک و بلند وارد پستان شده و از ضایعه مورد نظر چند نمونه کوچک تهیه می شود.	
مزایا	
- تشخیص سریع خوش خیم و یا بدخیم بودن ضایعه پستانی - عارضه کمتر نسبت به جراحی - هزینه کمتر نسبت به جراحی	
موارد منع انجام	
- مصرف داروهای ضد انعقادی که ممنوعیت مطلق ندارد، چون پستان یک بافت سطحی است و با کمپرس کردن محل بیوپسی خونریزی قابل کنترل است.	
روش جایگزین	
- بیوپسی باز در طی جراحی که علاوه بر هزینه بالا و تأخیر در بهبود زخم، عوارض بیهوشی نیز به آن اضافه می شود.	
توصیه های قبل از انجام	
- ناشتا نباشید. - مدارک قبلی شامل ماموگرافی و سونوگرافی را همراه بیاورید. - ۳ روز قبل از مراجعه، آسپرین یا داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی مثل ایبوپروفن، دیکلوفناک و ناپروکسن مصرف نکنید. - از مام و ادکلن استفاده نکنید. (موهای زائد زیر بغل شیو و تمیز باشد) - یک کمرست محکم به همراه داشته باشید. - یک نفر از بستگان درجه یک (با کارت شناسایی معتبر) را حتماً همراه بیاورید. - لازم است شما و همراهتان فرم رضایتنامه را پس از مطالعه دقیق امضاء کرده و اثر انگشت بزنید. - تهیه کردن لوازم مورد نیاز طبق لیست داده شده	
توصیه های بعد از انجام	
- پس از انجام بیوپسی محل آن کمی ورم کرده و کبود می شود که پس از چند روز برطرف می شود. - پس از انجام بیوپسی سینه بند خود را محکم و سفت ببندید. - پس از انجام بیوپسی کیسه یخ را روی منطقه طوری قرار دهید که پانسمان خیس نشود و پس از رسیدن به منزل کیسه یخ جدید را نیم ساعت گذاشته و ۱ ساعت نگذارید و تا پایان روز به طور مداوم اینکار را تکرار کنید. - تا ۲۴ ساعت حمام نروید. - تا چند روز بعد با دست سمت انجام بیوپسی، کار سنگین نکرده و وزن سنگین بلند نکنید. - از همان شب آنتی بیوتیک تجویز شده توسط دکتر را به مدت ۷ شب مصرف نمایید. - در صورت داشتن درد فقط استامینوفن ساده یا کدئین دار مصرف کنید و به هیچ وجه آسپیرین، ژلوفن، بروفن، مفنامیک اسید و... مصرف نفرمایید. - زمان تحویل نمونه بیوپسی به آزمایشگاه تمام مدارک پستان شامل ماموگرافی، سونوگرافی و MRI پستان را همراه داشته باشید. - (حضور شما برای تحویل نمونه به آزمایشگاه الزامی نیست.) - لطفاً درب نمونه را باز نکنید. محلول آن برای چشم، بینی و پوست مضر است.	
امضا و اثر انگشت بیمار	امضا و اثر انگشت همراه بیمار